Soporte Nutricional en Tiempos de COVID-19

Un Modelo de Adaptación a la Contingencia

Dra y Lic Nut Marisa Deforel

Consideraciones generales:

- PROTOCOLO de SOPORTE NUTRICIONAL en H. PIROVANO redactado en términos de Gestión de calidad
- ✓ Vigencia: 2016 a la fecha
- ✓ Cobertura: 40% de los pacientes internados
- ✓ Revisión de Procesos y la Mejora continua

"Premio a la Gestión de Calidad en Salud"
AÑO 2019.

UNIDAD DE PRESENTACIÓN (UP)

Categoría*: Marcar con un X la casilla que corresponda

UPE ☒	UPM ☐	UPAC ☐
--	-------------------------------------	--------------------------------------

*UPE: Unidad de Presentación de Elector / UPAC: Unidad de Presentación de Administración Central / UPM: Unidad de Presentación Múltiple

Nombre de la UP:	Programa de Soporte Nutricional
Organismo al que pertenece:	Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano

H2H0U0H0Z4

✓ OPORTUNIDAD

✓ ADECUACION

Mejoras Implementadas

Conservar / Minimizar el deterioro del ESTADO NUTRICIONAL
. Recuperación luego de la injuria . Objetivo del plan medico.

Ampliación de camas de cuidados críticos

Probable aumento en la internación general

Eventual Reducción del Recurso Humano por imposición de cuarentenas

- ✓ Necesidad de rápida toma de **decisiones** en Soporte
- ✓ Anticipar las previsiones de insumos

Garantizar el soporte nutricional **adecuado** al mayor número de beneficiarios durante este tiempo.

Fundamentación

Adaptación de Protocolo

OBJETIVOS

Agilizar la toma de decisiones vinculadas al Soporte nutricional de los potenciales pacientes que lo requieran en el contexto de la pandemia COVID 19

- Sintetizar la información a los efectores: en cuidados críticos y área de internación general, respecto a:

Prescripción recomendada

Estimación de Requerimientos

Monitoreo de Indicadores

Insumos requeridos

**La contingencia en Instituciones
Hospitalarias**

Aspectos Básicos:

- ✓ Definir modalidad de SOPORTE de los pacientes
- ✓ Normatizar la prescripción del Soporte en función de grado de injuria y demanda de cuidados
- ✓ Adecuar Insumos/Soporte

**ADAPTACION del PROTOCOLO de
SOPORTE NUTRICIONAL**

ORAL

ENTERAL

PARENTERAL

C R I T E R I O

- Edad
- Riesgo Basal (Screening)
- Estado Nutricional (*Subjetivo*)
- Adhesión

Prioritario

Según Protocolo previo

Precoz y Oportuno

Dominante en críticos

Contingente

MODALIDAD del Soporte

Aporte / EMM	Favorable	Desfavorable	Test
Kcal /día (mediana)	468kcal (RI: 369- 542)	350kcal (RI 250-480)	Test MW Wilcoxon p= 0,0018
Proteínas/ día (media)	21g (DS 8,7g)	16,9g (DS 9,2g)	Test T p= 0,01

Test T p 0,03

Suplementación y Evolución de Masa muscular

n 141

**C
R
I
T
E
R
I
O**

ORAL

- Edad
- Riesgo Basal (Screening)
- Estado Nutricional (*Subjetivo*)
- Adhesión

Prioritario

Según Protocolo previo

ENTERAL

- Insuficiencia ingesta
- Imposibilidad ingesta + Estabilidad Hemodinámica

Precoz y Oportuno

Dominante en críticos

PARENTERAL

- Indicaciones Específicas

Contingente

MODALIDAD del Soporte

M. Hiesmayr 2020 Medical University of Vienna.

The journey through COVID 19

Nutrición parenteral contingente

Do not forget these patients are still critically ill!

Recomendations from the Spanish Nutrition Working Group

	Clinical Issue	What to do?	Recommendation
1	High risk of refeeding syndrome ↓ Cardiac (e.g., arrhythmias) & respiratory complications (e.g., weaning problems)	Monitor P, Mg & ions ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Correct potential electrolyte & fluid disbalance • Vitamin & Thiamin (B₁) • Progressive (72-96h) administration of caloric & protein intake
2	Lack of follow up of nutritional needs during clinical course ("Autopilot")	Adapt caloric & protein intake during ICU stay ²	<ul style="list-style-type: none"> • Consider Parenteral Nutrition on 4th day (<60% of requirements are not achieved) • Consider non-nutritional calories when caloric debt is calculated (e.g., Propofol, citrate & glucose)
3	Glycemic control: hyperglycemia, clinical variability & hypoglycemia	Glucose 150 mg/dL ^{3,4}	<ul style="list-style-type: none"> • Consider the use of long-acting insulin twice a day together with rapid-acting insulin

1. McKnight CL, et al. Refeeding Syndrome in the Critically Ill: a Literature Review and Clinician's Guide. *Curr Gastroenterol Rep.* 2019;21:58.
2. Oshima T, et al. Supplemental Parenteral Nutrition Is the Key to Prevent Energy Deficits in Critically Ill Patients. *Nutr Clin Pract.* 2016;31:432-7.
3. Krinsley JS, et al. Glycemic variability: a strong independent predictor of mortality in critically ill patients. *Crit Care Med.* 2008;36:3008-13
4. Fox MA, et al. Insulin Glargine in Critically ill Patients: Once/Day versus Twice/Day Dosing. *Pharmacotherapy.* 2020 Mar;40(3):186-190.

✓ VNI : Aumenta el riesgo de Malnutrición → **Estrategia** SON / Nut. Parenteral

Nutrición Parenteral

Recomendaciones Nutricionales de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica para pacientes hospitalizados con infección por SARS-Cov-2

Hospitalización del paciente
SARS-COV2

PRESCRIPCIÓN Y REQUERIMIENTOS

- Diferencia el perfil clínico de los pacientes hospitalizados por SARS-Cov2 según el grado de respuesta a la enfermedad

Pacientes críticos con Insuficiencia respiratoria grave y Distres SDRA

Pacientes con Neumonías y dificultad respiratoria a tratar en internación general

- Considera Recomendaciones de Guías de buenas prácticas en soporte*

ESTIMACION de REQUERIMIENTOS

*ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit 2019 - ASPEN-SCCM 2016 -Recomendaciones para el Soporte Nutricional del Paciente Crítico con SDRA- Critical Care Specialist Group (CCSG) of the BDA Guidance on management of nutrition and dietetic services during the COVID-19 pandemic- Guías Alemanas de SN en Paciente Crítico 2019 -Recomendaciones para el Soporte Nutricional en Posición prono

Adaptado al estado Metabólico y Catabólico por Stress

Paciente Crítico

- Terapia Nutricional como SOPORTE VITAL

Paciente en cuidados clínicos

Adaptado al estado Metabólico y Catabólico

- Terapia Nutricional de recuperación y rehabilitación
- Protección de masa muscular

Mediana de NUU 19.35 g (RI 11.75g a 25.4g)

Considera el N2 endógeno derivado de la ingesta, y lo ajusta en su fórmula

Catabolismo inferido por IS (Preliminar. UTI Hospital Pirovano 2019)

Índice de stress catabólico Bistrían BR.

Adverse events (AE) and iatrogenic injuries associated with life support techniques.

Item	INVASIVE MECHANICAL VENTILATION	CONTINUOUS HAEMODIALYSIS	MEDICAL NUTRITION THERAPY
Indication	Alteration of ventilation Alteration of oxygenation Airway permeability	Uraemia Dyselectrolytaemia Hypervolemia Removing toxins (endogenous and exogenous) Hypothermia	Inadequate nutritional intake
Access	Tracheal tube Tracheostomy	Central venous line	Central venous line Enteral tube
Adjuvant treatments	Sedation Neuromuscular block Artificial nutrition Physiotherapy	Systemic anticoagulation Circuit heater or thermal blanket	Insulin administration for glycaemic control Physiotherapy
AE related to access	Stenosis, Granulomas, Mucosal necrosis	Hemorrhage Thrombosis	Hemorrhage Thrombosis
AE related to infections	Ventilator-associated pneumonia	Catheter-related infections	Sinusitis Catheter-related infections
AE related to toxicity	Oxygen toxicity	Heparin-induced thrombocytopenia. Citrate-induced hypocalcemia	Chemical phlebitis
AE related to the technique	Barotrauma: Lung injury due to positive pressure, overdistention and alveolar break Volutrauma: Lung injury due to local overdistention as a result of using excessive tidal volumes Atelectrauma: Alveolar damage as a result of transient and repeated closure and reopening of alveoli during the respiratory cycle. Biotrauma: Mechanical stress in response to using high tidal volume and inadequate positive end-expiratory pressure (PEEP) leading to a systemic inflammatory response	Dialytrauma: Harmful effects of continuous renal replacement therapy Dyselectrolytaemia: hypokalaemia, hypophosphataemia, hyponatraemia, hypo/hypercalcaemia, alteration of lactate metabolism Loss of endogenous vital nutrients: water-soluble vitamins, antioxidants, carbohydrates, amino acids Incorrect adjustment of drugs Hypothermia Blood loss: secondary to circuit lifespan	Nutritrauma: Over- and underfeeding, Hypervolaemia Uraemia Hypercapnia Hypertriglyceridaemia Refeeding syndrome Dyselectrolytaemia Hyperglycaemia Hepatobiliary disorders: Cholestasis, cholecystitis, cholelithiasis, hepatic steatosis, non-alcoholic fatty liver disease, hepatic fibrosis and cirrhosis Metabolic bone disease Malabsorptive diarrhea

Nutritrauma: A Key Concept for Minimising the Harmful Effects of the Administration of Medical Nutrition Therapy

Juan Carlos Yébenes 1,2,* , Lluís Campins 3, Itziar Martínez de Lagran 1, Lluïsa Bordeje 4, Carol Lorencio 5 , Teodoro Grau 6, Juan Carlos Montejo 6, Maria Bodí 7,2, Mateu Serra-Prat 8 and Working Group on Nutrition and Metabolism of the Spanish Society of Critical Care. Ago 2019

- . **Error de cálculo** (calorías y proteínas)
- . **Sobrecarga de fluidos**
- . **Glucosa en exceso**
- . **Desequilibrio electrolítico y ácido-base.**(depleción intracelular en la Malnutrición)
- . **Aporte calórico lipídico excesivo**
- . Nutrición parenteral prolongada y trast. Hepáticos asociados

Nutritrauma:
 Over- and underfeeding,
 Hypervolaemia
 Uraemia
 Hypercapnia
 Hypertriglyceridaemia
 Refeeding syndrome
 Dyselectrolytaemia
 Hyperglycaemia
 Hepatobiliary disorders:
 Cholestasis, cholecystitis,
 cholelithiasis, hepatic steatosis,
 non-alcoholic fatty liver disease,
 hepatic fibrosis and cirrhosis
 Metabolic bone disease
 Malabsorptive diarrhea

← Monitoreo

Adecuación Progresiva

Monitoreo

Tome el rango inferior si la dependencia al respirador es Alta.

Día 1 a 4 (70 %)
requerimiento por Fórmula Simplista

- 15 Kcal** (70% de 22 Kcal)
- por Peso Actual en < IMC 30
 - por P Ajustado * en > IMC 30

Día 5 a 8 (80-90%)
requerimiento por Fórmula Simplista

- 17-20 Kcal**
- por Peso Actual en <IMC 30
 - por P Ajustado en >IMC 30

Día 9 hasta destete del respirador

ESTIMACIÓN CALÓRICA: Críticos en ARM

* ideal+ 0,33 (Real-ideal)

Adecuación Progresiva

**Día 9 hasta destete del
respirador**

22 ... 25 Kcal
· por Peso Actual en < IMC 30

17-20 Kcal
· por Peso Actual en <IMC 30
· por P Ajustado en >IMC 30

ESTIMACIÓN CALÓRICA: Críticos en ARM

ESPEN expert statements and practical guidance for nutritional management of individuals with SARS-CoV-2 infection. Clinical Nutrition 2020 // Nutrition Therapy in the patient with COVID-19 Disease Requiring ICU care_SCCM-ASPEN. Apr 2020

ADECUACIÓN al Estado Nutricional BASAL

Malnutridos

EQUIVALENTE EGS C
IMC < 20,5 *
<50% Ingesta (1
sem.)/Obesos Mórbidos

RR Sme
Realimen
tación

Normonutridos

EQUIVALENTE EGS A

ESTIMACIÓN CALÓRICA: Pacientes en Cuidados
clínicos con Soporte

Malnutridos

Tome el valor superior del rango por caquexia , mayor injuria y gasto calórico predicho . Inferior si utiliza peso ajustado por Obesidad

Dia 1 a 3 (50 %)
requerimiento * 25-35 Kcal

13 -18 Kcal
· por Peso Actual o Ajustado

Dia 4 a 6 (75-80%)
requerimiento

20-27 Kcal
· por Peso Actual o Ajustado

Desde 1 semana
del Soporte **100%**
requerimiento

25-35 Kcal

ESTIMACIÓN CALORICA: Paciente en Cuidados Clínicos

Normonutridos

Desde 1 semana del Soporte

30 Kcal
· por **Peso Actual**

Día 1 a 7

28 Kcal
· por **Peso Actual o Ajustado (IMC 30 a 39)**

*Valor promedio del rango del Requerimiento * 25-30 Kcal/Kg*

ESTIMACIÓN CALORICA: Paciente en Cuidados Clínicos

ESPEN expert statements and practical guidance for nutritional management of individuals with SARS-CoV-2 infection
•Rocco Barazzoni ¹Stephan C. Bischoff

15 Kcal
· por Peso Actual o Ajustado

Críticos en ARM

18 Kcal
· por Peso Actual

MALNUTRIDO Cuidados
Clínicos

28 Kcal
· por Peso Actual

Equivalente EGS A Cuidados
Clínicos

Resumiendo... Para iniciar ...

Valor Único

Paciente Crítico

1,35 g/Kg PA
o Ajustado

Paciente Clínico

1,25 g/Kg PA
o Ajustado

ESTIMACIÓN REQUERIMIENTOS PROTEICOS

Protein intake and exercise for optimal muscle function with aging: Recommendations from the ESPEN Expert Group [Deutz NE](#)¹, [Bauer JM](#)², [Barazzoni R](#)³, [Biolo G](#)³, [Boirie Y](#)⁴, [Bosy-Westphal A](#)⁵, [Cederholm T](#)⁶, [Cruz-Jentoft A](#)⁷, [Krzniarç Z](#)⁸, [Nair KS](#)⁹, [Cantante P](#)¹⁰, [Teta D](#)¹¹, [Tipton K](#)¹², [PC Calder](#)¹³.

**Adecuación
Progresiva**

**Requerimientos
proteicos**

Día 1 a 5

**Fórmulas
Hiperproteicas
(33%) y DC max 1.2**

*Día 1: TODOS los pacientes se
prescriben "NE Formula a
Velocidad 25 ml/h"*

Día 6 en adelante

**Fórmulas
Hiperproteicas (20
% a 24%) DC hasta
1.5**

**Módulos
proteicos**

**FORMULAS ENTERALES: Pacientes Críticos
en ARM**

**Cualquier
Estado
Nutricional**

+

1ra Semana

**Fórmulas
Hiperproteicas
(21,5%) con HMB**

**Continuidad o rotación de
fórmula**

**Fórmulas
Prot: 16% a 24%
DC: 1 a 1,5**

Módulos reconstituidos

**300cc Isocalóricos
500 cc**

Día 1:

. BIC: TODOS los pacientes se prescriben "NE Formula a Velocidad 25 ml/h"

. Goteo Intermitente (4 hs /250cc): 20 gotas/min

**FORMULAS ENTERALES: en internación
clínica**

Nutroterapicos
ORALES

Formulas ENTERALES

SONDAS de acceso
enteral

BOMBAS de
INFUSION

Bolsas Parenterales
MAGISTRAL/Standard

INSUMOS REQUERIDOS

SNO

- Existencia de nutroterapicos
- Discriminación por tipos
- Stock para reconstituir (demanda / monitoreo de adhesion dificultosa)

Fórmulas ENTERALES

- Estimacion Kcal requeridas
- Estimación de proteínas requeridas
- Edad y comorbilidad

INSUMOS REQUERIDOS

Fórmulas Enterales Requeridas

36 respiradores abril a agosto

pacientes CRITICOS	estadia promedio 14 dias	5040 dias
-----------------------	-----------------------------	-----------

estimaciones a Peso
teorico 65 Kg

	1440 dias	1080 dias	2520 dias	
	4	7	14	
Kcal-pac-dia	975	1105	1430	
total Kcal	1.404.000	1.193.400	3.603.600	6.201.000

NO criticos
abril a agosto.

12 pacientes	© DN (30)	600 dias	estadia promedio 20 dias
	eutroficos (80)	1120 dias	estadia a 14 dias

estimacion a
peso 55 Kg
a peso
65 Kg

EGS C Desnut	90 dias	120	420
dias internac	3	7	20

Kcal-Kg-	18	23	30
total Kcal	97.200	165.600	756.000

756.000
faltan

	E. clinical	clinical	HP Energy Osmolit
prot1.25 -kg totales	45.000 g		

eutroficos	1120 dias
------------	-----------

peso /65 Kg
promedio

14 dias internac

2.038.400
Kcal

28 Kcl -Kg

Estimaciones

- Nro de Respiradores
- Tiempos de Ventilación mecánica
- Tratamiento ATB previsto con internación
- Estadías según Protocolo de Alta
- Requerimientos Calóricos y proteicos según normatización propuesta en el modelo de adaptación.

SNO

- Existencia de nutroterapicos
- Discriminación por tipos
- Stock para reconstituir (demanda / monitoreo de adhesion dificultosa)

Fórmulas ENTERALES

- Estimacion Kcal requeridas
- Estimación de proteínas requeridas
- Edad y Trofismo

BOMBAS de Infusión

- Exclusivas para nutricion enteral
- Disponibilidad de guías perfusoras compatibles
- Gestión de insumos suplementarios

SONDAS

- Materiales compatibles con farmacos del protocolo de tratamiento (siliconadas PVC)
- Disponibilidad

BOLSAS PARENTERALES

- Licitación disponible de BAP magistrales
- Bolsas standard de compra centralizadas y disponibles regularmente.

INSUMOS REQUERIDOS

MST	
Parámetros	Puntos
1) ¿Ha perdido peso recientemente de manera involuntaria?	
- No	0
- No estoy seguro	1
- Sí, he perdido peso	
• De 1 a 5 kg	1
• De 6 a 10 kg	2
• De 11 a 15 kg	3
• Más de 15 kg	4
• No sé cuánto	3
2) ¿Come mal por disminución de su apetito?	
- No	0
- Sí	1

NRS 2002			
0 A	1	¿IMC < 20.5?	SI NO
1 L	2	¿Pérdida de peso en los últimos 3 meses?	SI NO
2 M	3	¿Disminución en la ingesta en la última semana?	SI NO
	4	¿Enfermedad grave?	SI NO
3 Severa	Traumatismo craneal. Trasplante de médula. Paciente en cuidados Intensivos		

Peso Corporal
 Cambios en la ingesta
 Síntomas Gastrointestinal
 Capac.funcional
 Enferm actual y Stress
 Examen físico (TCS, MM,Edema)

- EGS A
- EGS B
- EGS C

Restricción en procedimientos

Aislamiento

Limitación en EPP

Estado Nutricional BASAL

Severamente Desnutrido ?

Normonutrido? Edad?

Obeso?

PESO (referido, estimado, percibido, default)

Talla (en UTI)

Mínimos resguardos?

NOMBRE

CAMA

PESO..... (REFERIDO o estimado)	TALLA..... (referida o estimada)	NORMONUTRIDO
INGESTA EN SEMANA ANTERIOR	PERDIDA DE PESO	MASA MUSCULAR DISMINUIDA
Normal	No	No SI
disminuida 50%	SI NO SABE MAS DE 2 Kg	SEVERAMENTE DESNUTRIDO
disminuida 25% o menos	EN 1 MES	MODERADAMENTE DESNUTRIDO
	No sabe

IMC 17.5

IMC 18.5

IMC 22.0

IMC 24.9

IMC 30

IMC 40

IMC 17.5

IMC 18.5

IMC 22.0

IMC 24.9

IMC 30

IMC 40

Soporte Nutricional en Tiempos de COVID-19

Un Modelo de Adaptación a la Contingencia

Dra y Lic Nut Marisa Deforel