FLUJOGRAMA SINDROME DE REALIMENTACIÓN

SRA:

Es la reducción en los niveles de 1 o cualquier combinación de P, K y/o Mg , o la manifestación de la deficiencia de tiamina, que se desarrolla (**horas a días**) después del inicio de la **provisión de calorías** (en forma oral, enteral o parenteral) en un **individuo expuesto a un período sustancial de desnutrición. (1)**

1) CONSIDERAR CRITERIOS DE RIESGO DE SRA

Riesgo Moderado:
2 **criterios** necesarios

Riesgo Significativo:
1 **criterio** necesario

- IMC 16-18,5 kg/m²
- Pérdida de peso del 5% en 1 mes
- Sin ingesta o < al 75% en 1 semana o más durante una enfermedad aguda
- Pérdida moderada de grasa subcutánea
- Pérdida leve a moderada de masa muscular
- Enfermedad moderada
- Niveles bajos de K ,P, Mg.(1)

- IMC < a 16 kg/m²
- Pérdida de peso del 7,5% en 3 meses o > 10% en 6 meses
- Sin ingesta o < al 50% mas de 5 días durante una enfermedad aguda
- Pérdida severa de grasa subcutánea
- Pérdida severa de masa muscular
- Enfermedad grave
- Niveles bajos de K ,P, Mg. que requieran múltiples reposiciones (1)

Chequear SIEMPRE LABORATORIO antes de iniciar el Soporte Nutricional en pacientes con Riesgo de SRA

FLUJOGRAMA SÍNDROME DE REALIMENTACIÓN

2) CONSIDERAR ENFERMEDADES Y CONDICIONES CLÍNICAS ASOCIADAS CON UN MAYOR RIESGO DE SÍNDROME DE REALIMENTACIÓN

"EL SRA, PUEDE MANIFESTARSE A CUALQUIER EDAD A PARTIR DEL NACIMIENTO"

- **Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.**
- **Trastorno crónico por consumo de alcohol o drogas.**
- **Disfagia y dismotilidad esofágica.**
- **Trastornos de la conducta alimentaria.**
- **Hiperemesis gravídica o vómitos incoercibles.**
- **Estados malabsortivos.**
- **Cáncer.**
- **Deterioro neurológico avanzado.**
- **Post operatorio de cirugía bariátrica.**
- **Postoperatorios con complicaciones.**
- **Ayuno prolongado.**
- **Desnutrición.(1)**

FLUJOGRAMA SINDROME DE REALIMENTACIÓN

3) CONSIDERAR SIGNOS Y SÍNTOMAS ASOCIADOS CON EL SRA GRAVE (1)

HIPOFOSFATEMIA

- **Neurológico** : parestesias , debilidad, delirio ,desorientación, encefalopatía , convulsiones, coma, tetania.
- **Cardiaco**: Hipotensión, shock, disminución del volumen sistólico, disminución de la presión arterial media , aumento de la presión de cuña
- **Pulmonar**: debilidad diafragmática, insuficiencia respiratoria ,disnea.
- **Hematológico** : hemólisis , trombocitopenia, disfunción leucocitaria.

HIPOPOTASEMIA

- **Neurológico** : parálisis , debilidad.
- **Cardiaco** : arritmias .
- **Insuficiencia respiratoria.**
- **Gastrointestinal**: náuseas, vómito, estreñimiento
- **Otro**: rabdomiólisis, necrosis muscular.

HIPOMAGNESEMIA

- **Neurológico** :debilidad, temblor,espasmos musculares ,cambios en el estado mental , tetania, convulsiones, coma.
- **Cardiaco** : arritmias.
- **Gastrointestinal** : anorexia, náuseas, vómito,estreñimiento.

DEFICIENCIA TIAMINA

- **Encefalopatía**
- **Acidosis láctica**
- **Nistagmo**
- **Neuropatía**
- **Demencia**
- **Síndrome de Wernicke**
- **Psicosis de Korsakoff**
- **Beriberi húmedo y seco**

RETENCIÓN DE SODIO

- **Sobrecarga de fluidos**
- **Edema pulmonar**
- **Descompensación cardíaca**

FLUJOGRAMA SINDROME DE REALIMENTACIÓN

SINDROME DE REALIMENTACIÓN (1)

SI

NO

Valores Normales:

P: 2,5-4,5 mg/dl

K: 3,5-4,8 mEq/l

Mg: 1,7-2,55 mg/dl

LEVE

Reducción del **10-20%** de los valores previos de P, K o Mg.

MODERADO

Reducción del **20-30%** de los valores previos de P, K o Mg.

GRAVE

Reducción **> 30 % y/o disfunción orgánica por reducción de P, K o Mg y/o déficit de Tiamina**

Inicio del Soporte Nutricional

progresión lenta y escalonada según fase de criticidad según protocolo

Evaluar signos y síntomas de SRA

"Reevaluar los requerimientos al menos 1 vez x semana o ante la presencia de cambios en la condición clínica del paciente"

Retrasar el inicio del Soporte Nutricional y/o progresión hasta corregir déficit

FLUJOGRAMA SINDROME DE REALIMENTACIÓN

TRATAMIENTO DEL SRA

Corregir déficit de electrolitos

POTASIO

SEVERIDAD	VALORES PLASMÁTICOS	DEFICIT CORPORAL TOTAL ESTIMADO	REPOSICIÓN
LEVE	3.5 a 3.0 mEq/l	200 a 400 mEq	Vía oral o EV: 40 a 80 mEq por día Vía EV: hasta 10 mEq/h
MODERADO	2.9 a 2.5 mEq/l	400 a 800 mEq	Vía EV: Vía periférica: hasta 20 mEq/h Vía central: hasta 40 mEq/h
SEVERO	2.4 mEq/l o menos	> 800 mEq	Vía central: hasta 40 mEq/h. Si hay síntomas de gravedad hasta 60 – 80 mEq/h.

Presentaciones farmacológicas disponibles más comunes:
 Gluconato de potasio. Jarabe 31.2 gr/100 ml vía oral *
 Cloruro de potasio. Capsulas por 600 mg *
 Cloruro de potasio. Ampollas por 15 mEq/5 ml
 *1 mg = 0.26 mEq

FÓSFORO

SEVERIDAD	VALORES PLASMÁTICOS	REPOSICIÓN (mmol por día)*		
		40 a 60 kg	61 a 80 kg	81 a 120 kg
LEVE	2.5 a 2.0 mg/dl	30	40	50
MODERADO	1.9 a 1.0 mg/dl	20	30	40
SEVERO	1.0 mg/dl o menos	10	15	20

Presentaciones farmacológicas disponibles más comunes:
 No se dispone forma farmacéutica vía oral
 Fosfato de potasio. Ampollas por 60 mEq/10 ml **
 Fosfato de sodio. Ampollas por 30 mmol/5 ml
 *La reposición debe tener una duración NO menor a 6 hs.
 **1 mEq/L = 1 mmol/L

MAGNESIO

1 o 2 ampollas diluidas en 100 ml de Solución salina 0.9% o Dextrosa 5% a pasar en 10 minutos suele ser suficiente para normalizar los valores y tratar los síntomas asociados.
 Se puede repetir según sea necesario.
 Se dispone de Sulfato de Magnesio 25% en ampollas por 5 o 10 ml.

- REPOSICIÓN ORAL SOLO EN DÉFICIT LEVES.
- EN DEPLECIONES SEVERAS / SINTOMÁTICAS DEBE SER VÍA ENDOVENOSA.
- SIEMPRE REPONER EL DÉFICIT ESTIMADO MÁS LAS PÉRDIDAS ACTUALES

FLUJOGRAMA SINDROME DE REALIMENTACIÓN

TRATAMIENTO DEL SRA

Suplementar Tiamina : 200 a 300 mg intravenoso 30 minutos antes de iniciar el soporte nutricional según Guías NICE (National Institute for Health and Care Excellence) (2 y 3) ó 100 mg /día antes de iniciar la nutrición y 100 mg/día durante 5-7 días o más en pacientes con inanición severa (1)

Agregar Multivitamínico oral /enteral 1 vez x día x 10 días (Hierro, si es necesario luego del 7° día)

Inicio del Soporte Nutricional

FLUJOGRAMA SÍNDROME DE REALIMENTACIÓN

Inicio del Soporte Nutricional (1)

Iniciar con 100-150 gr de dextrosa o 10-20 kcal/kg durante los primeros 3 días

Avanzar en un 33% de la meta cada 1 a 2 días
(considerar progresión según etapa de criticidad de paciente crítico)

Monitorizar cada 12 horas durante los primeros 3 días en pacientes de alto riesgo

- Control diario de K, P, Mg los primeros 3 días, luego cada 2 días
- Examen Físico

Si los electrolitos se vuelven difíciles de corregir o caen precipitadamente durante el inicio de la nutrición, disminuir las calorías / gramos de dextrosa en un 50% y avanzar en un 33% del objetivo cada 1-2 días.

BIBLIOGRAFIA:

- 1) ASPEN CONSENSUS RECOMMENDATIONS FOR REFEEDING SYNDROME. NUTRITION IN CLINICAL PRACTICE 35 (2).APRIL 2020. [HTTPS://DOI.ORG/10.1002/NCP.10474](https://doi.org/10.1002/ncp.10474).
- 2) GALINDO MCA ET AL. SÍNDROME DE REALIMENTACIÓN EN EL PACIENTE CRÍTICAMENTE ENFERMO.REV MEX PATOL CLIN MED LAB 2019; 66 (3): 154-159
- 3)REFEEDING SYNDROME: WHAT IT IS, AND HOW TO PREVENT AND TREAT IT HISHAM M MEHANNA, JAMIL MOLEDINA, JANE TRAVIS.2008 JUN 28; 336(7659): 1495-1498.