

FLUJOGRAMA

1

COLOCAR LA Sonda AL MOMENTO DE INTUBAR AL PACIENTE



2

SUSPENDER LA NUTRICIÓN ENTERAL 1 HORA ANTES DE PRONAR AL PACIENTE

3

CONTROLAR LA COLOCACIÓN DEL ACCESO ENTERAL ANTES DE REINICIAR



4

POSICIÓN TREDELENBURG INVERTIDA (10-25°C)

5

ADMINISTRAR PROQUINÉTICOS A CORTO PLAZO SEGÚN INDICACIÓN MÉDICA



6

PROPORCIONAR NUTRICIÓN ENTERAL CONTINUA, PRIORIZAR BOMBA DE INFUSIÓN

7

INICIAR CON EL 30% DE SUS REQUERIMIENTOS Y PROGRESAR LA NUTRICIÓN ENTERAL SEGÚN TOLERANCIA



8

EVALUAR RESTOS DE NUTRICIÓN ENTERAL EN EL MOMENTO DE ENJUAGE BUCAL

9

SUSPENDER LA NUTRICIÓN ENTERAL 1 HORA ANTES DE SUPINAR AL PACIENTE.



10

CONTROLAR LA COLOCACIÓN DEL ACCESO ENTERAL ANTES DE REINICIAR



SUGERENCIA:

PARA EVITAR UNA DEUDA CALÓRICA-PROTEICA DIVIDIR LOS REQUERIMIENTOS EN 18-22 HORAS/DÍA